

Agradecemos por escolher o Veros Hospital Veterinário.

Para que tenha a melhor experiência possível, fique atento:

- É necessário **jejum alimentar de 8h**, não é necessário jejum hídrico.
- Filhotes até **6 meses com até 5 kg, 4h de jejum** alimentar, não é necessário jejum hídrico;
- Filhotes até **6 meses**, com mais de **5 kg, 8h de jejum alimentar**, não é necessário jejum hídrico;
- A coleta pode ser realizada no Pronto Socorro, por ordem de chegada;
- De Segunda a Sexta **das 7h às 19h30** |
Sábados: **7h às 15h30** os exames são encaminhados ao Provet;
Domingos os exames são realizados em equipamento da Idexx ou seguem para o Provet na segunda-feira;
- Chegar com **30 minutos de antecedência**;
- Trazer a via original do pedido de exame;

ORIENTAÇÃO – BIOQUÍMICOS (FUNÇÃO RENAL E HEPÁTICA)

Para os exames bioquímicos, como função renal e hepática, recomenda-se seguir as orientações abaixo:

- Jejum alimentar de 12 horas, permitindo o consumo de água normalmente (sem jejum hídrico)
- Evitar esforço físico intenso antes da coleta;
- Garantir que o paciente esteja em repouso e em ambiente tranquilo antes do exame;
- Em caso de uso contínuo de medicação, informar ao responsável técnico antes da coleta.

ORIENTAÇÃO – HORMONAIS

Os exames hormonais são mais específicos e, em muitos casos, requerem coletas múltiplas com intervalos definidos.

Orientações gerais:

- Jejum alimentar de 12 horas, permitindo o consumo de água até o momento da coleta;
- Trazer a via original do pedido médico/veterinário;
- Alguns exames exigem duas coletas, com intervalo de tempo ou após alimentação controlada;
- Seguir rigorosamente o horário e a sequência de coletas informados pelo laboratório ou veterinário responsável.

Exemplos de exames com preparo especial:

- Ácidos biliares pré e pós-prandial: duas coletas – uma em jejum e outra 2h após alimentação;
- Amônia basal e pós-prandial: jejum e nova coleta após refeição leve, conforme orientação (**2ª coleta realizada 6 horas após a 1ª coleta**);
- Teste de estimulação com ACTH: coleta basal e nova amostra após administração do hormônio (**2ª coleta realizada 1 hora após a 1ª coleta**);
- Teste de supressão com dexametasona: coleta basal e amostras em intervalos específicos após administração do medicamento.

Para 2 dosagens - 2ª coleta 8 horas após a primeira coleta

Para 3 dosagens - Coleta a cada 4 horas considerando o horário da 1ª coleta como base.

Esses exames exigem cumprimento rigoroso do preparo para garantir resultados confiáveis.